

شکستگی های فک بالا

شکستگی فک بالا بیشتر در مردان و در اثر تصادفات رخ می دهد . فک بالا حالت متحرک به خود می گیرد و جابجا می شود ممکن است کام دچار آسیب شود درمان بیشتر از ۱۴ روز نباید به تعویق بیافتد در غیر اینصورت جوش خوردگی نابجا درمان را مشکل تر خواهد کرد .

عموماً در درمان این شکستگی دو فک به هم بسته می شوند تا روند ترمیم به خوبی صورت پذیرد

توصیه های پس از ترخیص :

- دو فک به مدت چهار تا شش هفته به هم بسته می شوند در طول این مدت همواره یک سیم چین به همراه داشته باشید تا در صورت علائم تهوع و استفراغ و احتمال خفگی سریع دهان خود را باز کنید.
- بهداشت دهان به خوبی رعایت شود استفاده از مسواک نرم و محلول دهانشویه فراموش نشود. در غیر اینصورت احتمال پوسیدگی دندان ها و عفونی شدن ناحیه جراحی افزایش می یابد
- استفاده از دخانیات ممنوع
- مصرف دارهای تجویز شده توسط جراح فک مانند آنتی بیوتیک ضد احتقان ، ضد درد
- مراجعه دوره ای به کلینیک جهت ارزیابی ترمیم شکستگی های جراحی شده
- انجام فیزیوتراپی بعد از باز کردن دهان در صورت تجویز پزشک

