

آبسه های دندانی

عفونت های با منشأ دندانی شایع ترین عفونت ها در میان عفونت های سر و گردن است و بیشتر در ریشه دندان متمرکز می ماند اما در بعضی موارد به بافت های اطراف پخش می شود این مساله که متمرکز می ماند و یا عفونت پخش می شود تا حدی بستگی به مقاومت بدن فرد و قدرت باکتری دارد.

نحوه درمان :

برش و تخلیه آبسه و دارو درمانی می باشد. و درمان جایگزینی وجود ندارد و در صورت عدم مراجعه عواقب جدی در برخواهد داشت .

مراحل و طول مدت احتمالی درمان بسته به نوع آبسه بسیار متفاوت می باشد .

از عوارض احتمالی درمان دیر هنگام درگیری راه هوایی و مشکل در تنفس می باشد .

علائم بیماری :

درد هنگام جویدن ، التهاب ، قرمزی ، حساسیت دندان به گرما و سرما و سخت باز شدن دهان است و علائم عمومی شامل تب ، میزان نبض و تنفس بالا و التهاب غدد لنفاوی موضعی است .

توصیه های پس از ترخیص :

۱- چنانچه در محل آبسه درن وجود دارد بایستی حداکثر ۷۲ ساعت بعد به درمانگاه مراجعه نماید تا در صورت لزوم درن تعویض و یا خارج شود .

۲- تعویض پانسمان روزانه ضروری می باشد.

۳- شستشوی مرتب داخل دهان چنانچه درن داخل دهانی باشد ضرورت دارد.

۴- استفاده از آنتی بیوتیک های تجویز شده و مسکن و دهانشویه طبق دستور

۵- در صورت تب و لرز به درمانگاه مراجعه نمائید.

۶- در صورت علائمی نظیر استفراغ و تهوع و دل پیچه در اولین فرصت به پزشک خود مراجعه کنید.

۷- غذاهای پر پروتئین و کم چرب توصیه میشود .

۸- در اولین فرصت ممکن نسبت به خارج کردن عامل عفونت که معمولاً دندان پوسیده است اقدام نمائید.